

藍腹鵝與山鷓鴣

文／張漢欽
繪圖／賴吉仁

藍腹鵝和山鷓鴣都是台灣特有鳥種。在野地裡很難發現牠們的倩影，尤以名列為華盛頓公約組織名錄第 I 類的藍腹鵝為最。牠們棲息於海拔800~2200公尺間的樹林中，隨著溫差的起落上下遷徙。以穀類、蠕蟲、甲蟲的幼體為食物，尤其嗜食龍葵、蕃茄，更喜歡中海拔的金線蓮。由於棲地和食物相同，牠們更猶若難兄難弟般的形影常隨。

在黎明前、黃昏後、薄霧時分或雨絲不斷的天候，正是牠倆外出覓食的好時機。山鷓鴣任「馬前卒」，藍腹鵝隨後跟進。山鷓鴣的型體圓滾小巧，適於在濃密的矮灌木群和草叢中探尋。當山鷓鴣發現有金線蓮時，總會自傲的呼應兩聲，知會尾隨的藍腹鵝，然後就對著金線蓮埋頭苦幹起來。

原來蛇類對金線蓮也有特殊的嗜好，尤其在牠們受傷或病痛時，金線蓮就是牠們的治病良方。當蛇類發現金線蓮，若當時天候佳，俟確立方位，即產生記憶(有病時可以回來食用)，之後會立刻離開；但天候不佳而無法確定方位時，每在金線蓮四周徘徊。當巧遇山鷓鴣因嗜食而警覺最弱時候(平時山鷓鴣神經過敏，遍體觸覺靈敏，其他物種欲親近牠，實在太難)等於天賜良機，於是飽餐一頓，消化之餘，方打圈遠引而去。藍腹鵝在確定危機已消除，才對剩餘的金線蓮大快朵頤。

金線蓮天生就需藉助藍腹鵝來播種。藍腹鵝腸胃裡有某些菌種，可以分解金線蓮的種子外殼，當果仁隨便排出，會隨藍腹鵝逛到哪長到哪，而且可以在很短的時間內發芽成長，此乃早期金線蓮的採擷者，祇要能查出藍腹鵝、山鷓鴣的足跡，即可確定附近必有金線蓮的主因。金線蓮自然長成的種子，若墜落或隨風飄送，可要一年以後才能發芽。金線蓮、藍腹鵝、山鷓鴣，以及蛇之間的食物鏈及微妙關係由此可見。

藍腹鵝是出了名的神經質鳥種，卻具特異功能，可以在滿佈枯葉的地上行走、起飛、滑落，而保持靜寂無聲。當身上披著五顏六色彩裳的雄鳥領著母鳥，帶著數隻幼鳥，悠遊漫步於山間小徑時，睥睨群倫的英姿，尊容華貴，難以比擬，莫怪乎歐洲學者斯文豪初發現牠們時，也不禁要驚嘆天地造物之美。藍腹鵝的美，不在於牠華麗璀璨的外觀，而是牠那份恬淡的氣度，與優雅高貴的舉止，而贏得「母后之儀」的封號，而藍腹鵝也以發現者而命名為「斯文豪氏雉」。

(感謝羅東「碧涵軒」鳥園協助 TEL:03-9954550)



藍腹鵝(左)♂、(右)♀。